

PRVA POMOĆ KOD EPILEPTIČKOG NAPADAJA




PREPOZNAJTE EPILEPTIČKI NAPADAJ



- IZNENADNI GUBITAK SVIJESTI
- FIKSIRANI POGLED ILI IZVRTANJE OČIJU
- UKOČENOST, SAVIJANJE LEĐA U LUK, STISNUTE ŠAKE
- NEKONTROLIRANI GRČEVITI POKRETI
- POJAVA PJENE NA USTIMA TIJEKOM NAPADA, UGRIZ JEZIKA ILI USNICE
- GUBITAK KONTROLE NAD MOKRENJEM ILI STOLICOM

OSTANITE MIRNI

VAŽNO JE SAČUVATI PRIBRANOST I UČINITI SVE POTREBNO
KAKO BI SE OSOBI KOJA IMA NAPAD POMOGLA




SPRIJEČITE MOGUĆE OZLJEDE



POSEBICE OZLJEDE GLAVE,
STAVITE JASTUK ILI
SLIČAN MEKANI PREDMET
POD GLAVU OSOBE KOJA
IMA NAPAD

POSTAVITE OSOBU U BOČNI POLOŽAJ



NE POKUŠAVAJTE SPUTAVATI ILI
ZAUSTAVITI POKRETE OSOBE KOJA IMA
NAPAD!

- NE STAVLJAJTE NIŠTA IZMEĐU ZUBI ILI U USTA OSOBE TIJEKOM NAPADA
- OLABAVITE ODJEĆU OKO VRATA (OVRATNIK I SL.)
- IZ NEPOSREDNE OKOLINE UKLONITE SVE OPASNE PREDMETE
- POKUŠAJTE MJERITI VRIJEME NAPADA



NE OSTAVLJAJTE OSOBU SAMU



- TIJEKOM I NAKON NAPADA VAŽNO JE DA BUDETE UZ OSOBU
- NEKA VAŠ NAČIN POMOĆI I GOVOR BUDU UMIRLJIVI
- NEKA U BLIZINI BUDU SAMO OSOBE KOJE PRUŽAJU POMOĆ

POZOVITE HITNU POMOĆ

- UKOLIKO NAPAD TRAJE DUŽE OD 3 MINUTE
- DRUGI NAPAD POČNE UBRZO NAKON PRVOG
- AKO OSOBA NE DOLAZI K SVIJESTI
- UKOLIKO OSOBA BOLUJE OD DRUGIH KRONIČNIH BOLESTI

 **194**

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC

Karla Kovačević,
bacc.med.techn.



Korištena literatura:

https://www.hck.hr/UserDocImages/dokumenti/Mladi/Natjecanje%202020/6_Repetitorij%20za%20prvu%20pomo%C4%87%20za%20mlade.pdf